

AQS1[®] Quartalsauswertung

4. Quartal 2007, Praxis 05312

Grundgesamtheit

| | Aktuelle Periode | Alle Perioden | |
|-------------------------|------------------|---------------|--------------|
| | Praxis | Praxis | Alle Praxen* |
| Arzt-Fragebögen | 199 | 531 | 132.406 |
| Patienten-Fragebögen | 124 | 309 | 59.703 |
| Patienten-Rücklaufquote | 62% | 58% | 45% |

*) Repräsentative Menge Fragebögen aus dem Gesamtkollektiv aller Praxen (1. Quartal 2003 bis 3. Quartal 2006)

1. Allgemeine Daten zum Patienten

Geschlecht

| | Praxis | Gesamt |
|----------|--------|--------|
| Männlich | 56% | 33% |
| Weiblich | 44% | 67% |

Altersverteilung

| Alter in Jahren | bis 9 | 10 bis 19 | 20 bis 34 | 35 bis 49 | 50 bis 64 | ab 65 |
|-----------------|-------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------|
| Praxis | 1,5% | 6,0% | 12,6% | 33,2% | 30,2% | 16,6% |
| Gesamt | 4,2% | 4,0% | 20,7% | 34,6% | 22,8% | 13,8% |

Arbeitsverhältnis

| | Praxis | Gesamt |
|---------------|--------|--------|
| Angestellt | 44% | 46% |
| Selbständig | 7% | 6% |
| Beamter/in | 3% | 4% |
| Rentner/in | 19% | 19% |
| Hausfrau/mann | 14% | 14% |
| Ausbildung | 6% | 5% |
| Arbeitslos | 2% | 6% |


Krankenversicherung

| | Praxis | Gesamt |
|--------------|--------|--------|
| Gesetzlich | 85% | 85% |
| Privat | 12% | 11% |
| Berufsgen. | 1% | 1% |
| Selbstzahler | 0% | 1% |

Wahl der Praxisklinik

| | Praxis | Gesamt |
|--------------|--------|--------|
| Überweisung | 46,8% | 58,3% |
| Vorerfahrung | 41,1% | 18,0% |
| Empfehlung | 29,8% | 26,4% |
| Telefonbuch | 0,8% | 0,5% |
| Branchenbuch | 0,0% | 0,6% |
| Internet | 0,0% | 1,4% |
| Sonstiges | 1,6% | 5,3% |

Legende



MW=Mittelwert, SD=75% Standardabweichung

2. Gesundheitszustand des Patienten

Allgemeiner Gesundheitszustand

| | Praxis | Gesamt |
|---------------|--------|--------|
| Sehr gut | 20% | 22% |
| Gut | 62% | 60% |
| Mittel | 16% | 16% |
| Schlecht | 1% | 2% |
| Sehr schlecht | 0% | 0% |

ASA-Klassifikation

| | Praxis | Gesamt |
|----------------|--------|--------|
| ASA-Klasse I | 52% | 61% |
| ASA-Klasse II | 31% | 34% |
| ASA-Klasse III | 16% | 5% |
| ASA-Klasse IV | 0% | 0% |

Beeinträchtigung durch Erkrankung

| | Praxis | Gesamt |
|------------|--------|--------|
| Gar nicht | 8% | 15% |
| Gering | 25% | 23% |
| Mittel | 42% | 31% |
| Stark | 20% | 24% |
| Sehr stark | 5% | 6% |

Arbeitsunfähigkeit

| | Praxis | Gesamt |
|-------------|--------|--------|
| Vor der OP | 2,6 | 3,0 |
| Nach der OP | 9,9 | 9,8 |

Zeitangabe in Tagen

Medizinische Risikofaktoren

| | Praxis | Vergleich |
|---------------------|--------|-------------|
| Herz-Kreislauf | 31,7% | 15,0% 41,8% |
| Gerinnungsstörung | 0,0% | 0,9% 8,1% |
| Respirationstrakt | 5,5% | 6,1% 24,2% |
| Thromboserisiko | 2,5% | 3,0% 15,7% |
| Adipositas | 30,2% | 10,5% 33,5% |
| Diabetes | 4,0% | 2,6% 14,4% |
| Allergie | 17,1% | 5,8% 23,3% |
| Stoffwechselstörung | 2,0% | 3,2% 16,3% |
| Krampfleiden | 1,0% | 0,9% 8,2% |
| Sonstiges | 2,0% | 8,7% 29,8% |

Wundkontaminationsklasse

| | Praxis | Vergleich |
|-------------------|--------|-------------|
| Aseptisch | 94,8% | 34,4% 69,1% |
| Bedingt aseptisch | 2,6% | 28,3% 62,1% |
| Kontaminiert | 2,1% | 1,4% 10,3% |
| Septisch | 0,5% | 1,2% 9,4% |

Dringlichkeit des Eingriffs

| | Praxis | Vergleich |
|-----------|--------|-------------|
| Elektiv | 99,5% | 71,6% 92,0% |
| Dringlich | 0,0% | 7,4% 26,9% |
| Notfall | 0,5% | 0,7% 6,7% |

3. Operation

Allgemeine Daten

| | Praxis | Vergleich |
|---|--------|-------------------|
| Aufklärung zur Narkose vor dem OP-Tag | 93,6% | 15,4% 52,8% 90,3% |
| Aufklärung zur Operation vor dem OP-Tag | 100,0% | — |
| Second Opinion | 98,5% | 4,2% 41,1% 78,0% |
| Primäreingriff | 91,0% | 70,2% 91,3% |
| Histologie entnommen | 28,1% | 12,7% 50,2% 87,7% |
| Diagnose intraoperativ bestätigt | 99,0% | 86,8% 97,8% |

Kurz vor der OP

| | Praxis | Vergleich | Verlauf |
|---|--------|-------------------|----------------|
| Wartezeit OP-Termin bis OP-Beginn (Minuten) | 18,7 | 21,5 36,5 51,4 | 22,0 7,1 |
| Patient war unruhig und nervös vor der OP | 21,7% | 11,5% 18,7% 25,9% | 24,1% 16,9% |

Q1 Q2 Q3 Q4/2007

Befunde durch

| | Praxis | Vergleich |
|------------------|--------|-------------------|
| Operateur | 0,0% | 18,5% 47,6% |
| Anästhesisten | 0,0% | 10,9% 34,3% |
| Zuweisenden Arzt | 91,0% | 24,1% 60,7% 97,3% |

Anästhesiedurchführung

| | Praxis | Vergleich |
|-------------|--------|-------------|
| Anästhesist | 100,0% | 81,1% 95,9% |
| Operateur | 0,0% | 4,1% 18,9% |

OP-Organisation

| | Praxis | Vergleich |
|---------------------|--------|----------------|
| Einleitungszeit | — | 8,9 |
| Schnitt-Naht-Zeit | 17,7 | 13,4 30,3 47,3 |
| OP-Blockierungszeit | 35,1 | 29,1 49,6 70,0 |

Zeitangabe in Minuten

Art der Anästhesie

| | Praxis | Vergleich |
|--------------------|--------|-------------------|
| Intubationsnarkose | 0,5% | 16,3% 43,9% |
| Maskennarkose | 0,0% | 8,4% 29,3% |
| Larynxmaske | 69,8% | 24,3% 60,9% 97,5% |
| Spinalanästhesie | 0,0% | 0,4% 5,4% |
| Epiduralanästhesie | 0,0% | 0,0% 1,5% |
| Plexusanästhesie | 0,0% | 4,4% 19,8% |
| Lokalanästhesie | 0,0% | 5,7% 23,0% |
| Nervenblockade | 0,0% | 1,0% 8,3% |
| Stand by | 0,0% | 2,1% 12,8% |
| iv.-Block | 25,6% | 2,1% 12,9% |
| Sonstiges | 0,0% | 2,0% 12,6% |

Assistenz

| | Mindestens eine | | Durchschn. Anzahl | |
|--------------------------|-----------------|-------------|-------------------|-------------|
| | Praxis | Vergleich | Praxis | Vergleich |
| Ärztlich/Operateur | 0,0% | 24,8% 57,0% | 0,0 | 0,3 0,6 |
| Nicht ärztl./Operateur | 100,0% | 83,5% 96,8% | 1,3 | 0,8 1,2 1,6 |
| Ärztlich/Anästhesist | 0,0% | 4,4% 19,9% | | |
| Nicht ärztl./Anästhesist | 100,0% | 55,4% 83,3% | | |

Perioperative Medikation

| | Prä-OP | | Intra-OP | | Post-OP | |
|------------------|--------|-------------|----------|-------------------|---------|------------------|
| | Praxis | Vergleich | Praxis | Vergleich | Praxis | Vergleich |
| Analgetika | 0,0% | 27,7% 61,3% | 31,7% | 21,7% 58,6% 95,5% | 38,7% | 4,9% 41,9% 79,0% |
| Antibiotika | 0,0% | 6,1% 24,1% | 0,0% | 2,3% 13,7% | 0,0% | 0,6% 6,6% |
| Antiemetika | 0,0% | 4,1% 19,1% | 0,0% | 7,3% 26,9% | 0,0% | 2,8% 15,0% |
| Antikoagulantien | 0,0% | 16,1% 43,6% | 0,0% | 2,3% 13,6% | 0,0% | 6,2% 24,4% |
| Antihypertensiva | 0,0% | 1,1% 8,8% | 0,0% | 1,0% 8,7% | 0,0% | 0,1% 3,0% |
| Anticholinergika | 0,0% | 13,9% 39,9% | 0,0% | 6,5% 24,9% | 0,0% | 0,1% 3,0% |
| Antihypotensiva | 0,0% | 0,3% 4,3% | 0,0% | 2,0% 12,6% | 0,0% | 0,6% 6,4% |
| O2-Insufflation | 0,0% | 22,0% 53,1% | 0,0% | 24,8% 57,2% | 0,0% | 4,7% 20,5% |
| Sedativa | 0,0% | 31,9% 66,6% | 0,0% | 23,2% 54,8% | 0,0% | 0,3% 4,2% |
| Lokalanästhetika | 0,0% | 5,9% 23,5% | 0,0% | 18,9% 48,2% | 0,0% | 5,2% 21,8% |
| Sonstiges | 0,0% | 2,5% 14,1% | 0,0% | 10,4% 33,4% | 0,0% | 1,3% 9,9% |

Studienfeld

| | A | B | C | D | E | F |
|-------------|------|------|------|------|------|------|
| Studienfeld | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |

4. Komplikationen

Komplikationen intraoperativ Operateur

| | Praxis | Vergleich | Verlauf |
|----------------------|--------|-----------|---------|
| Blutung | 0,0% | 0,3% 4,2% | 3,9% |
| Techn./Instrumentell | 0,0% | 0,1% 2,7% | 2,6% |
| Nervenläsion | 0,0% | 0,1% 2,0% | 1,9% |
| Abbruch der OP | 0,0% | 0,1% 2,2% | 2,2% |
| Gewebsläsion | 0,0% | 0,1% 2,0% | 1,9% |
| Erweiterung der OP | 0,0% | 0,2% 3,2% | 3,0% |
| Sonstiges | 0,0% | 0,1% 2,4% | 2,3% |

Q1 Q2 Q3 Q4/2007

Komplikationen intraoperativ Anästhesist

| | Ohne Bedeutung für Betreuung im AWR | | | Mit Bedeutung für Betreuung im AWR | | | Länger im AWR oder Verlegung auf Intensiv- oder Wachstation | | |
|-------------------|-------------------------------------|------------|---------|------------------------------------|-----------|---------|---|-----------|---------|
| | Praxis | Vergleich | Verlauf | Praxis | Vergleich | Verlauf | Praxis | Vergleich | Verlauf |
| Herz-Kreislauf | 0,5% | 1,8% 11,9% | 10,0% | 1,0% | 0,4% 4,9% | 4,9% | 0,0% | 0,0% 1,7% | 1,7% |
| Medikamente | 0,0% | 0,0% 6,7% | 6,0% | 0,0% | 0,0% 1,1% | 1,1% | 0,0% | 0,0% 0,0% | 0,0% |
| Respirationstrakt | 0,0% | 0,8% 7,6% | 6,8% | 0,0% | 0,2% 3,3% | 3,1% | 0,0% | 0,0% 1,5% | 1,5% |
| Techn. Probleme | 0,0% | 0,7% 7,0% | 6,3% | 0,0% | 0,0% 1,6% | 1,6% | 0,0% | 0,0% 0,0% | 0,0% |
| Aspiration | 0,0% | 0,7% 6,7% | 6,1% | 0,0% | 0,0% 0,7% | 0,7% | 0,0% | 0,0% 0,5% | 0,5% |
| Sonstiges | 0,0% | 0,7% 7,0% | 6,3% | 0,0% | 0,1% 2,4% | 2,3% | 0,0% | 0,0% 1,5% | 1,5% |

Q1 Q2 Q3 Q4/2007

Komplikationen postoperativ

| | Entzündung der Wunde | | | Thrombose* | | | Bluterguss/Nachblutung | | |
|-------------|----------------------|------------|---------|------------|------------|---------|------------------------|-------------|---------|
| | Praxis | Vergleich | Verlauf | Praxis | Vergleich | Verlauf | Praxis | Vergleich | Verlauf |
| Unbehandelt | 4,2% | 1,2% 9,3% | 8,1% | 0,0% | 0,3% 4,6% | 4,3% | 16,4% | 18,1% 46,9% | 28,9% |
| Behandelt | 1,7% | 4,8% 20,9% | 16,1% | 0,0% | 2,4% 13,8% | 11,4% | 2,6% | 5,2% 21,9% | 15,7% |

Q1 Q2 Q3 Q4/2007

Behandlung der postoperativen Komplikationen

Lesebeispiel: "...% der Patienten hatten eine Thrombose, die mit Medikamenten behandelt wurde"

| | Entzündung der Wunde | | | Thrombose | | | Bluterguss/Nachblutung | | |
|------------------|----------------------|------------|---------|-----------|------------|---------|------------------------|------------|---------|
| | Praxis | Vergleich | Verlauf | Praxis | Vergleich | Verlauf | Praxis | Vergleich | Verlauf |
| Medikamente | 1,7% | 3,9% 18,5% | 14,5% | 0,0% | 2,2% 13,2% | 11,0% | | | |
| Spülung | 0,0% | 1,4% 10,1% | 8,7% | | | | | | |
| Salbenverband | | | | | | | 1,7% | 3,0% 15,8% | 12,8% |
| Punktion | | | | | | | 0,9% | 2,2% 13,4% | 11,1% |
| Kompressionsbeh. | | | | 0,0% | — | | | | |
| Sonstiges | 0,8% | 0,9% 7,8% | 7,0% | 0,0% | 0,6% 6,5% | 5,9% | 0,0% | 0,8% 7,3% | 6,5% |

Q1 Q2 Q3 Q4/2007

Notfall vor der Entlassung

| | Praxis | Vergleich | Verlauf |
|---------------------|--------|------------|---------|
| Stationäre Aufnahme | 0,0% | 2,0% 12,4% | 10,4% |

Q1 Q2 Q3 Q4/2007

Notfall nach der Entlassung

| | Praxis | Vergleich | Verlauf |
|-----------------------|--------|------------|---------|
| Notfallmäßig zum Arzt | 0,8% | 1,8% 11,9% | 10,1% |

Q1 Q2 Q3 Q4/2007

5. Im Aufwachraum

Beschwerden im Aufwachraum

| | Ohne Bedeutung für Betreuung im AWR | | | Mit Bedeutung für Betreuung im AWR | | | Länger im AWR oder Verlegung auf Intensiv- oder Wachstation | | |
|----------------------|-------------------------------------|---------------|---------|------------------------------------|---------------|---------|---|---------------|---------|
| | Praxis | Vergleich | Verlauf | Praxis | Vergleich | Verlauf | Praxis | Vergleich | Verlauf |
| Übelkeit | 0,0% | 1,5% 10,5% | → 9,0% | 0,0% | 0,7% 6,9% | → 6,2% | 0,0% | 0,3% 4,2% | → 4,0% |
| Erbrechen | 0,0% | 1,1% 9,0% | → 0,0% | 0,0% | 0,4% 5,1% | → 4,7% | 0,0% | 0,2% 3,2% | → 3,0% |
| Wundschmerzen | 19,6% | 9,0% 30,5% | → 10,1% | 8,5% | 7,6% 27,5% | → 31,6% | 0,0% | 1,5% 10,6% | → 9,1% |
| Muskelschmerzen | 0,0% | 2,7% 14,8% | → 12,1% | 0,0% | 0,2% 3,7% | → 3,5% | 0,0% | 0,0% 1,5% | → 1,5% |
| Halsschmerzen | 2,0% | 1,2% 9,4% | → 8,2% | 0,0% | 0,2% 3,5% | → 3,3% | 0,0% | 0,0% 1,1% | → 1,1% |
| Kopfschmerzen | 0,0% | 1,0% 8,5% | → 7,5% | 0,0% | 0,1% 2,9% | → 2,7% | 0,0% | 0,0% 1,2% | → 1,2% |
| Kreislaufprobleme | 0,0% | 1,5% 10,4% | → 9,0% | 0,0% | 0,9% 7,9% | → 7,0% | 0,0% | 0,3% 4,7% | → 4,4% |
| Atmung | 0,0% | 1,0% 8,6% | → 7,6% | 0,0% | 0,2% 3,5% | → 3,3% | 0,0% | 0,0% 1,4% | → 1,4% |
| Allergische Reaktion | 0,0% | 1,0% 8,3% | → 7,3% | 0,0% | 0,0% 0,9% | → 0,9% | 0,0% | 0,0% 0,5% | → 0,5% |
| Harnverhalt | 0,0% | 0,9% 8,2% | → 7,2% | 0,0% | 0,0% 1,5% | → 1,5% | 0,0% | 0,0% 1,2% | → 1,2% |

Betreuung im Aufwachraum

| | Praxis | Vergleich | Verlauf |
|------------------------|--------|----------------------|---------|
| Schlechte Versorgung | 0,0% | 0,0% 2,0% 3,9% | → 1,9% |
| Zu wenig Schmerzmittel | 0,8% | 4,2% 9,2% | → 4,9% |
| Zu wenig Ruhe | 1,6% | 0,7% 3,5% 6,4% | → 2,8% |

Zeit im Aufwachraum

| | Praxis | Vergleich |
|----------------|--------|------------------------|
| Zeit (Minuten) | 58,0 | 64,4 115,3 166,3 |

6. Zu Hause

Betreuung zu Hause

| | Praxis | Vergleich |
|------------------------|--------|------------------|
| Alleinstehend | 13% | 24% 56% |
| Begleitung nach Hause | 100% | 81% 96% |
| Ausreichende Betreuung | 100% | 81% 96% |
| Anruf des OP-Teams | 90% | 0% 36% 72% |

Transport nach Hause

| | Praxis | Gesamt |
|------------------|--------|--------|
| Privater PKW | 97,6% | 85,5% |
| Krankentransport | 0,0% | 2,7% |
| Öffentlich | 0,0% | 2,2% |
| Taxi | 2,4% | 6,6% |
| Sonstiges | 0,0% | 3,0% |

| | Praxis | Vergleich | Verlauf |
|-----------------------------|--------|---------------|---------|
| Zu wenig Medikamente | 0,8% | 5,7% 23,0% | → 17,3% |
| OP-Team schlecht erreichbar | 0,0% | 8,1% 28,5% | → 20,4% |

Beschwerden zu Hause

(0="Keine Schmerzen" bis 10="Unerträgliche Schmerzen")

| | Durchschnittlich | | | Prozentual | |
|--------------------------------|------------------|----------------------|---------|------------|------|
| | Praxis | Vergleich | Verlauf | Keine | > 6 |
| Übelkeit | 0,22 | 0,66 1,99 | → 1,33 | 92,2% | 0,9% |
| Kreislaufprobleme | 0,53 | 1,16 2,71 | → 1,55 | 77,4% | 1,7% |
| Schlafprobleme | 0,69 | 0,95 2,43 | → 1,48 | 75,7% | 0,9% |
| Kopfschmerzen | 0,24 | 0,58 1,72 | → 1,14 | 89,7% | 0,9% |
| Halsschmerzen | 0,56 | 0,89 2,24 | → 1,35 | 79,5% | 1,7% |
| Muskelschmerzen | 0,53 | 0,81 2,19 | → 1,38 | 77,6% | 0,0% |
| Wundschmerzen bis 3. Tag | 1,98 | 0,54 2,31 4,08 | → 2,77 | 29,9% | 0,9% |
| Wundschmerzen nach 3. Tag | 1,36 | 1,44 2,93 | → 2,08 | 44,4% | 2,8% |
| Schwellung nach 5. Tag | 1,56 | 1,51 3,20 | → 2,38 | 46,7% | 3,7% |
| Schwierigkeiten beim Stuhlgang | 0,23 | 0,55 1,72 | → 1,17 | 89,6% | 0,0% |
| Probleme beim Wasserlassen | 0,16 | 0,30 1,14 | → 0,84 | 92,2% | 0,0% |

7. Patientenzufriedenheit

Bewertung

(1="Sehr gut", 2="Gut", 3="Mittel", 4="Schlecht", 5="Sehr schlecht")

| Praxis & Praxisteam | | Mittelwert | Vergleich | Verlauf | 1 - 2 | 4 - 5 |
|---------------------|---|------------|----------------|---------|-------|-------|
| | | | | | | |
| Praxis & Praxisteam | Freundlichkeit und Hilfsbereitschaft | 1,23 | 1,15 1,31 1,46 | 1,32 | 98% | 0% |
| | Organisation und Terminplanung | 1,33 | 1,32 1,48 1,64 | 1,41 | 98% | 1% |
| | Erklärung des organisatorischen Ablaufs | 1,41 | 1,34 1,55 1,75 | 1,52 | 95% | 1% |
| | Ausstattung der Praxis | 1,34 | 1,32 1,47 1,62 | 1,37 | 98% | 0% |

| Operateur | | Mittelwert | Vergleich | Verlauf | 1 - 2 | 4 - 5 |
|-----------|---|------------|----------------|---------|-------|-------|
| | | | | | | |
| Operateur | Erklärung der Diagnose | 1,40 | 1,01 1,48 1,94 | 1,58 | 96% | 1% |
| | Erklärung der Operation | 1,47 | 1,03 1,56 2,09 | 1,67 | 93% | 0% |
| | Aufklärung über Risiken und Vorteile | 1,50 | 1,10 1,88 2,26 | 1,74 | 92% | 1% |
| | Information über weitere Behandlung nach OP | 1,54 | 1,14 1,77 2,40 | 1,83 | 92% | 3% |

| Anästhesist | | Mittelwert | Vergleich | Verlauf | 1 - 2 | 4 - 5 |
|-------------|--|------------|----------------|---------|-------|-------|
| | | | | | | |
| Anästhesist | Aufklärung über Art und Ablauf der Narkose | 1,19 | 1,05 1,49 2,02 | 1,53 | 100% | 0% |
| | Aufklärung über Risiken durch die Narkose | 1,33 | 1,05 1,70 2,35 | 1,65 | 96% | 1% |
| | Zerstreuung der Angst vor der Narkose | 1,42 | 1,03 1,60 2,18 | 1,67 | 96% | 0% |

| Zeit für offene Fragen... | | Genug | | | Zu wenig | Keine |
|---------------------------|----------------------------------|--------|-----------|---------|----------|-------|
| | | Praxis | Vergleich | Verlauf | | |
| Zeit für offene Fragen... | ...des Operateurs vor der OP | 94% | 91% 69% | 100% | 6% | 0% |
| | ...des Operateurs nach der OP | 90% | 84% 57% | 100% | 8% | 2% |
| | ...des Anästhesisten zur Narkose | 99% | 91% 69% | 100% | 1% | 0% |

| Verbesserungspotential | | Anteil mit größtem empfundenen Verbesserungsbedarf | | | | |
|------------------------|---|--|----|-----|-----|-----|
| | | 0% | 5% | 10% | 15% | 20% |
| Verbesserungspotential | Persönl. Betreuung durch den Narkosearzt | | | | | |
| | Betreuung nach der OP bis zur Entlassung | | | | | |
| | Telefonische Erreichbarkeit der Praxis | | | | | |
| | Beratung & Aufklärung durch den Narkosearzt | | | | | |
| | Persönl. Betreuung durch den Operateur | | | | | |
| | Freundlichkeit des OP-Personals | | | | | |
| | Wartezeiten in der Praxis | | | | | |
| | Sauberkeit und Hygiene in der Praxis | | | | | |
| | Nachsorge (z.B. Verbandswechsel) | | | | | |
| | Wartezeiten für Operationstermin | | | | | |
| | Freundlichkeit des Empfangspersonals | | | | | |
| | Beratung & Aufklärung durch den Operateur | | | | | |

Gesamtbewertung

(1="Sehr gut", 2="Gut", 3="Mittel", 4="Schlecht", 5="Sehr schlecht")

| | Mittelwert | Vergleich | Verlauf | 1 - 2 | 4 - 5 |
|-------------------------------|------------|----------------|---------|-------|-------|
| Gesamtbewertung des Eingriffs | 1,33 | 1,29 1,41 1,52 | 1,36 | 98% | 1% |

| | Praxis | Vergleich | Verlauf |
|---|--------|-------------|---------|
| Würde sich wieder ambulant operieren lassen | 99,2% | 97,5% 85,7% | 100,0% |
| Würde Praxisklinik weiterempfehlen | 98,4% | 98,6% 96,0% | 99,4% |